

病名 : 進行非小細胞肺癌

レジメンセット名 : TC+Bmab (AUC=5)療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 4 コース

アバステンはPDまで

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 TC + Bmab (AUC=5)療法 ①コース: 21日 グラニセロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 1mg/50mL(先: カイトリル) デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先: テカトロン) 輸液セット・フィルターはPVCフリー	1 本 3 V	15分	時間未定
2	DIV 点滴注射 15 分で ファモチジン注射用 20mg/A(前カモファー) ボラミン注 5mg/1mL/A 大塚生食注 50mL	1 A 1 A 1 本	15分	時間未定
3	DIV 点滴注射 200mg/m <sup>2</sup> 3 時間で ハクシタキセル注「ホスピール」 30mg/5mL/V(タキソール) ブドウ糖液(テルモ糖注) 5% 500mL	200 mg /m <sup>2</sup> 1 本	3時間で	時間未定
4	DIV 点滴注射 5×(GFR+25)mg 1 時間で AUC=5 カルボプラチン注 NKJ 450mg/45mL/V ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	5 mg /GFR+25 1 本	1時間で	時間未定
5	DIV 点滴注射 初回90分、2回目60分、3回目~30分 アバステン点滴静注用 100mg/4mL/V 大塚生食注 100mL	15 mg /kg 1 本	90分→60分→ 30分	14:00
6	DIV 点滴注射 15分で ルートフラッシュ 大塚生食注 50mL	1 本		時間未定