病　名　：　**進行・再発非小細胞肺癌**

レジメンセット名　：　ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+CBDCA+PEM

1コース期間（休薬期間含む）　21　日　上限　4　コース

ｷｲﾄﾙｰﾀﾞとPEMとはPDまで

GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV　点滴注射		5～10分	時間未定
	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+CBDCA+PEM療法 インターバル:21日			
	大塚生食注 50mL	1 本		
	ルートキープ用			
2	DIV　点滴注射		30分	時間未定
	インラインフィルターを使用			
	大塚生食注 100mL	1 本		
	キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V	200 mg /Body		
3	DIV　点滴注射		全開で	時間未定
	フラッシュ用			
	大塚生食注 50mL	1 本		
4	DIV　点滴注射		15分で	時間未定
	大塚生食注 50mL	1 本		
	アロキシ静注 0.75mg/5mL/V	1 V		
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ)	1 V		
5	DIV　点滴注射		10分で	時間未定
	500mg/m²			
	アリムタ注射用 100mg/V	500 mg /m²		
	大塚生食注 100mL	1 本		
6	DIV　点滴注射		1時間で	時間未定
	AUC=5			
	カルボプラチン注「NK」 450mg/45mL/V	5 mg /GFR+25		
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1 本		
7	DIV　点滴注射		全開で	時間未定
	フラッシュ用			
	大塚生食注 50mL	1 本		