

病名 : 尿路上皮癌

レジメンセット名 : GEM単独

1コース期間(休薬期間含む) 28 日 上限 PDまで コース

| 分類 | GpNo. | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day(15) |
|------|------------|----------------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 注射 | 1 | DIV 点滴注射 | | 30分で | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 |
| | | グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL(先:カイトリル) | 1本 | | | | |
| | | GEMZAR(ゲムシチン) | | | | | |
| | | デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン) | 1V | | | | |
| | 2 | DIV 点滴注射 | | 30分で | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 |
| | | 大塚生食注 100mL | 100 ml | | | | |
| | | ゲムシチン点滴静注用「ヤクルト」1g/V(先:ジェムザール) | 1000 mg /m ² | | | | |
| | | 1000mg/m ² | | | | | |
| | 3 | DIV 点滴注射 | | 15分で | 時間未定 | | |
| | 大塚生食注 50mL | 1本 | | | | | |
| 処方 | | | | | | | |
| コメント | | | | | | | |