

病名 : 切除不能・再発膀胱がん

レジメンセット名 : PCG療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(8)
注射	1	DIV 点滴注射 9:00-17:00 PCG療法 ルート確保用 ソルアセトF輸液 500mL(先:ウーイーンF)	1本		時間未定				時間未定
	2	側 点滴注射(側管) 10:00-10:15 側管より グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先:カイトリル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1V	15分で	時間未定				時間未定
	3	側 点滴注射(側管) 10:15-10:30 側管より ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー) ボララミン注 5mg/1mL/A 大塚生食注 50mL	1A 1A 1本	15分で	時間未定				時間未定
	4	側 点滴注射(側管) 10:30-12:30 PVCフリー ハツタキセル注(ホスピーラ) 30mg/5mL/V(タキソール) 80mg/m ² ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	80 mg /m ² 1本	28時間で	時間未定				時間未定
	5	側 点滴注射(側管) 12:30-13:00 側管より 1000mg/m ² ケムシロビン点滴静注用(ヤクルト)1g/V(先:ジェムサール) 大塚生食注 100mL	1000 mg /m ² 1本	30分で	時間未定				時間未定
	6	DIV 点滴注射 17:00-5:00 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタ3)	1本		時間未定				
	7	DIV 点滴注射 5:00-17:00 PCG療法 Day2 ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本		時間未定				
	8	側 点滴注射(側管) 10:00-10:30 側管より グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先:カイトリル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1V	30分で	時間未定				
	9	側 点滴注射(側管) 10:30-12:30 側管より 混注しTOTAL 500mLにして シスプラチン注「日医工」 10mg/20mL/V 70mg/m ² テルモ生食注 500mL	70 mg /m ² 500 ml	28時間で	時間未定				
	10	側 点滴注射(側管) 12:30-14:30 マンニトールS注射液 300mL	1本		時間未定				
	11	DIV 点滴注射 17:00-5:00			時間未定				

	17:00-5:00						
	ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本					
12	DIV 点滴注射					時間未定	時間未定
	5:00-17:00						
	ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本					
13	側 点滴注射(側管)		30分で			時間未定	時間未定
	10:00-10:30 側管より						
	大塚生食注 100mL	1本					
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V					
14	DIV 点滴注射					時間未定	時間未定
	17:00-5:00						
	ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本					
処方							
コメント							