

病名 : 悪性リンパ腫

レジメンセット名 : R-CHOP療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射	1	DIV 点滴注射 R-CHOP療法(day1) ラインキープ用 大塚生食注 50mL カロナール・ポララミン内服	1本		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 1mg/mLに調製 375mg/m <sup>2</sup> リツキサン点滴静注 500mg テルモ生食注 500mL 大塚生食注 100mL	375 mg /m <sup>2</sup> 1本 1本	1時間毎に 25mL/時→ 100mL/時→ 200mL/時で上 げる	時間未定	
	3	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本	リツキサンと同じ速 度で	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 R-CHOP療法(day2) 閉塞性器具を使用。ラインキープ用 大塚生食注 50mL ブレドニン内服(day2-6)	1本		時間未定	
	5	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL (アロキン)	1本		15分で	時間未定
	6	DIV 点滴注射 750mg/m <sup>2</sup> 閉塞性器具を使用 エンドキサン注射用 100mg/V 大塚生食注 250mL	750 mg /m <sup>2</sup> 1本		2時間で	時間未定
	7	DIV 点滴注射 50mg/m <sup>2</sup> 閉塞性器具を使用 アドリアシン注用 10mg/V 大塚生食注 50mL	50 mg /m <sup>2</sup> 1本		30分で	時間未定
	8	IV 静脈内注射 1.4mg/m <sup>2</sup> (MAX2mg) 閉塞性器具を使用 オンコピン注 1mg/V 大塚生食注 50mL	1.4 mg /m <sup>2</sup> 1本		15分で	時間未定
	9	DIV 点滴注射			全開で	時間未定