

病名 : 濾胞性リンパ腫

レジメンセット名 : GB

1コース期間(休業期間含む) 21日 上限 6 コース

【1サイクル目】







GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(8)
1	DIV 点滴注射 GB療法(1サイクル目、day1) 閉塞器具を使用。ラインキープ用。 大塚生食注 50mL	1本		時間未定		
	投与30分前にカロナール400mg、ボララミン2mg内服。他薬に変更の可能性あり、指示コメントを優先					
2	DIV 点滴注射 総量250mLに調製、1000mg/body 閉塞器具を使用 ガザイバ点滴静注液 1000mg/40mL/V 大塚生食注 250mL	1000 mg /Body 1本	12.5mL/時で開始し30分毎に12.5mL/時ずつ上げる。 MAX100mL/時。	時間未定		
3	DIV 点滴注射 閉塞器具を使用 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本	ガザイバと同じ流速で	時間未定		
4	DIV 点滴注射 GB療法(1サイクル目、day2) 閉塞器具を使用 大塚生食注 50mL ラインキープ用	1本			時間未定	
5	DIV 点滴注射 閉塞器具を使用 グラセプトン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先:カトリル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトリル)	1本 1.5 V	15分で	時間未定	時間未定	
6	DIV 点滴注射 90mg/m ² 閉塞器具を使用 トリアキソ点滴静注液 100mg/4mL 大塚生食注 50mL	90 mg /m ² 1本	10分で	時間未定	時間未定	
7	DIV 点滴注射 閉塞器具を使用 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本	全開で	時間未定	時間未定	
8	DIV 点滴注射 GB療法(1サイクル目、day8,15) ラインキープ用。 大塚生食注 50mL	1本				時間未定 B
	投与30分前にカロナール400mg、ボララミン2mg内服。他薬に変更の可能性あり、指示コメントを優先					

9	DIV 点滴注射		25mL/時で開始し30分毎に25mL/時ずつ上げる。MAX100mL/時。		時間未定	B
	総量250mLに調製、1000mg/body					
	ガザイバ点滴静注液 1000mg/40mL/V	1000 mg /Body				
	大塚生食注 250mL	1本				
10	DIV 点滴注射		ガザイバと同じ流速で		時間未定	B
	大塚生食注 50mL	1本				
	フラッシュ用					

【2-6サイクル目】

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
1	DIV 点滴注射			時間未定	
	GB療法(2-6サイクル目,day1) 閉塞器具を使用。ラインキープ用。				
	大塚生食注 50mL	1本			
	投与30分前にカロナール400mg、ボララミン2mg内服。他薬に変更の可能性あり、指示コメントを優先				
2	DIV 点滴注射		25mL/時で開始し30分毎に25mL/時ずつ上げる。MAX100mL/時。	時間未定	
	総量250mLに調製、1000mg/body 閉塞器具を使用				
	ガザイバ点滴静注液 1000mg/40mL/V	1000 mg /Body			
	大塚生食注 250mL	1本			
3	DIV 点滴注射		ガザイバと同じ流速で	時間未定	
	閉塞器具を使用				
	大塚生食注 50mL	1本			
	フラッシュ用				
4	DIV 点滴注射				時間未定
	GB療法(2-6サイクル目,day2) 閉塞器具を使用				
	大塚生食注 50mL	1本			
	ラインキープ用				
5	DIV 点滴注射		15分で	時間未定	時間未定
	閉塞器具を使用				
	クラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL(先:カトリル)	1本			
	デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デカトロン)	1.5 V			
6	DIV 点滴注射		10分で	時間未定	時間未定
	90mg/m ² 閉塞器具を使用				
	トリアキソ点滴静注液 100mg/4mL	90 mg /m ²			
	大塚生食注 50mL	1本			
7	DIV 点滴注射		全開で	時間未定	時間未定
	閉塞器具を使用				
	大塚生食注 50mL	1本			

day(15)



時間未定



時間未定

時間未定