

病名 :

悪性リンパ腫

レジメンセット名 : R-THP-GOP

1コース期間(休業期間含む) 21 日 上限

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	
注射	1	DIV 点滴注射			時間未定		
		R-THP-GOP(day1) ルートキープ用 大塚生食注 50mL カロナール・ボララミン内服	1本				
	2	DIV 点滴注射			1時間毎に 25mL/時→ 100mL/時→ 200mL/時で上 げる	時間未定	
		リツキサン点滴静注 500mg テルモ生食注 500mL 大塚生食注 100mL 375mg/m ²	375 mg /m ² 1本 1本				
	3	DIV 点滴注射			リツキサンと同じ速 度で	時間未定	
		大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本				
	4	DIV 点滴注射				時間未定	
		R-THP-GOP(day2) 閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL ルートキープ用	1本				
	5	DIV 点滴注射			15分で	時間未定	
		閉塞性器具を使用 ハロ/セトロン点滴静注パック0.75mg/50mL (アロキン)	1本				
	6	IV 静脈内注射			30分で	時間未定	
		閉塞性器具を使用 ピルビン注射用 30mg/V ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 100mL 50mg/m ²	50 mg /m ² 1本				
	7	DIV 点滴注射			15分で	時間未定	
		閉塞性器具を使用 オンコビン注 1mg/V 大塚生食注 50mL 1.4mg/m ² (MAX2mg/body)	1.4 mg /m ² 1本				
	8	DIV 点滴注射			2時間で	時間未定	
		閉塞性器具を使用 エンドキサン注射用 100mg/V 大塚生食注 250mL 750mg/m ²	750 mg /m ² 1本				
	9	DIV 点滴注射			全開で	時間未定	
		閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本				

