

病名 :

悪性リンパ腫

レジメンセット名 :                     R-トリアキシシン                    

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射	1	DIV 点滴注射 R-トリアキシシン(day1) ラインキープ用・閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 R-トリアキシシン(day2) ラインキープ用 大塚生食注 50mL 閉塞性器具を使用	1本		時間未定	
	3	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先 カトルル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先デカトル)	1本	15分で	時間未定	時間未定
	4	IV 静脈内注射 90mg/m <sup>2</sup> 閉塞性器具を使用 トリアキシシン点滴静注液 100mg/4mL 大塚生食注 250mL 調製後6時間以内に投与を終了する	90 mg /m <sup>2</sup> 1本	10分で	時間未定	時間未定
	5	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL カロナール・ボララミン内服	1本	30分で	時間未定	
	6	DIV 点滴注射 1mg/mLに調製 375mg/m <sup>2</sup> 閉塞性器具を使用 リツキサシン点滴静注 500mg テルモ生食注 500mL 大塚生食注 100mL	375 mg /m <sup>2</sup> 1本 1本	1時間毎に 25mL/時→ 100mL/時→ 200mL/時で上 げる	時間未定	
	7	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本	リツキサシンと同じ速 度で	時間未定	
	8	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本	全開で	時間未定	