

病名 : 多発性骨髄腫

レジメンセット名 : DKd療法(1サイクル目)

1コース期間(休薬期間含む) 28 日 上限 PDまで コース

| GpNo | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(8) | day(9) | day(15) | day(16) | day(22) |
|------|--|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | SC 皮下注射 DKd療法(1サイクル)d1,8,15,22 ダラキューロ投与前に、モノルカスト(d1のみ) 、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ホララシ前処置あり。 ダラキューロ配合皮下注 15mL/V シリンジ払出し | 15 ml /Body | | 時間未定 | | 時間未定 | | 時間未定 | | 時間未定 |
| 2 | DIV 点滴注射 DKd療法(1サイクル)d1,2 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1 本 | | 時間未定 | 時間未定 | | | | | |
| 3 | DIV 点滴注射 20mg/m ² カイワリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 100mL 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V | 20 mg /m ² | 30分で | 時間未定 | 時間未定 | | | | | |
| 4 | DIV 点滴注射 フラッシュ用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1 本 | | 時間未定 | 時間未定 | | | | | |
| 5 | DIV 点滴注射 DKd療法(1サイクル)d8,9 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1 本 | | | | 時間未定 | 時間未定 | | | |
| 6 | DIV 点滴注射 56mg/m ² カイワリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 100mL 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V | 56 mg /m ² | 30分で | | | 時間未定 | 時間未定 | | | |
| 7 | DIV 点滴注射 フラッシュ用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1 本 | | | | 時間未定 | 時間未定 | | | |
| 8 | DIV 点滴注射 DKd療法(1サイクル)d15,16 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1 本 | | | | | | 時間未定 | 時間未定 | |
| 9 | DIV 点滴注射 56mg/m ² カイワリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V | 56 mg /m ² | 30分で | | | | | 時間未定 | 時間未定 | |

病名 : 多発性骨髄腫

レジメンセット名 : DKd療法(3-6サイクル目)

1コース期間(休業期間含む) 28 日 上限 PDまで コース

| GpNo | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(8) | day(9) | day(15) | day(16) |
|------|--|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | SC 皮下注射 DKd療法(3-6サイクル)d1,15 ダラキューロ投与前にデキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミン前処置あり。 ダラキューロ配合皮下注 15mL/V シリンジ払出し | 15 ml /Body | | 時間未定 | | | | 時間未定 | |
| 2 | DIV 点滴注射 DKd療法(3-6サイクル)d1,2 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | 時間未定 | 時間未定 | | | | |
| 3 | DIV 点滴注射 56mg/m ² カイクリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 100mL 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V | 56 mg /m ² | 30分で | 時間未定 | 時間未定 | | | | |
| 4 | DIV 点滴注射 フラッシュ用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | 時間未定 | 時間未定 | | | | |
| 5 | DIV 点滴注射 DKd療法(3-6サイクル)d8,9 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | | | 時間未定 | 時間未定 | | |
| 6 | DIV 点滴注射 56mg/m ² カイクリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V | 56 mg /m ² | 30分で | | | 時間未定 | 時間未定 | | |
| 7 | DIV 点滴注射 フラッシュ用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | | | 時間未定 | 時間未定 | | |
| 8 | DIV 点滴注射 DKd療法(3-6サイクル)d15,16 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | | | | | 時間未定 | 時間未定 |
| 9 | DIV 点滴注射 56mg/m ² カイクリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V | 56 mg /m ² | 30分で | | | | | 時間未定 | 時間未定 |
| 10 | DIV 点滴注射 フラッシュ用 | | | | | | | 時間未定 | 時間未定 |

病名 : 多発性骨髄腫

レジメンセット名 : DKd療法(7サイクル目以降)

1コース期間(休業期間含む) 日 上限 PDまで コース

| GpNo | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(8) | day(9) | day(15) | day(16) |
|------|--|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1 | SC 皮下注射 DKd療法(7サイクル目以降)d1 ダラキューロ投与前にデキサメタゾン、アセトアミノフェン、ボラミン前処置あり。 ダラキューロ配合皮下注 15mL/V シリンジ払出し | 15 ml /Body | | 時間未定 | | | | | |
| 2 | DIV 点滴注射 DKd療法(7サイクル目以降)d1,2 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | 時間未定 | 時間未定 | | | | |
| 3 | DIV 点滴注射 56mg/m ² カイクリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 100mL 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V | 56 mg /m ² | 30分で | 時間未定 | 時間未定 | | | | |
| 4 | DIV 点滴注射 フラッシュ用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | 時間未定 | 時間未定 | | | | |
| 5 | DIV 点滴注射 DKd療法(7サイクル目以降)d8,9 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | | | 時間未定 | 時間未定 | | |
| 6 | DIV 点滴注射 56mg/m ² カイクリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V | 56 mg /m ² | 30分で | | | 時間未定 | 時間未定 | | |
| 7 | DIV 点滴注射 フラッシュ用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | | | 時間未定 | 時間未定 | | |
| 8 | DIV 点滴注射 DKd療法(7サイクル目以降)d15,16 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL | 1本 | | | | | | 時間未定 | 時間未定 |
| 9 | DIV 点滴注射 56mg/m ² カイクリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V | 56 mg /m ² | 30分で | | | | | 時間未定 | 時間未定 |
| 10 | DIV 点滴注射 フラッシュ用 | | | | | | | 時間未定 | 時間未定 |