

病名 : 多発性骨髄腫

レジメンセット名 : Weekly Kd療法(1サイクル目)

1コース期間(休業期間含む)  日 上限 PDまで コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
1	DIV 点滴注射 Weekly Kd(1サイクル)d1 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1本		時間未定		
2	DIV 点滴注射 20mg/m <sup>2</sup> カフケリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 100mL 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V	20 mg /m <sup>2</sup> 1本 2 A	30分で	時間未定		
3	DIV 点滴注射 フラッシュ用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1本		時間未定		
4	DIV 点滴注射 Weekly Kd(1サイクル)d8 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1本			時間未定	
5	DIV 点滴注射 70mg/m <sup>2</sup> カフケリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 100mL 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V	70 mg /m <sup>2</sup> 1本 3 A	30分で	時間未定		
6	DIV 点滴注射 フラッシュ用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1本			時間未定	
7	DIV 点滴注射 Weekly Kd療法(1サイクル)d15 ルート確保用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1本				時間未定
8	DIV 点滴注射 70mg/m <sup>2</sup> カフケリス点滴静注用10mg 注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V	70 mg /m <sup>2</sup> 3 A	30分で			時間未定
9	DIV 点滴注射 フラッシュ用 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1本				時間未定

病名 : 多発性骨髄腫

レジメンセット名 : Weekly Kd療法(2サイクル目以降)

1コース期間(休薬期間含む)  日 上限 PDまで コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
1	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
	Weekly Kd(2-9サイクル)d1,8,15 ルート確保用					
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1本				
2	DIV 点滴注射		30分で	時間未定	時間未定	時間未定
	70mg/m <sup>2</sup>					
	カイクリス点滴静注用10mg	70 mg /m <sup>2</sup>				
	注射用水で1Vを2mg/mLとなるように溶解					
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 100mL	1本				
	注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V	2 A				
3	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定
	フラッシュ用					
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 50mL	1本				