

病名 : ①びまん性大細胞型、高悪性度、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫②再発または難治性の濾胞性リンパ腫

レジメンセット名 : エプコリタマブ(1サイクル目)

1コース期間(休業期間含む) 日 上限 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
1	SC 皮下注射 エプコリタマブ(1サイクル目)Day1 皮下30-120分前に加ナル、レスタミン、DEX投与			時間未定			
	エプキンリ皮下注 4mg/0.8mL/V	0.16 mg /Body					
	投与翌日から3日間、DEX16mg内服						
	大塚生食注 20mL	1 A					
2	SC 皮下注射 エプコリタマブ(1サイクル目)Day8 皮下30-120分前に加ナル、レスタミン、DEX投与				時間未定		
	エプキンリ皮下注 4mg/0.8mL/V	0.8 mg /Body					
	投与翌日から3日間、DEX16mg内服						
	大塚生食注 20mL	1 A					
3	SC 皮下注射 エプコリタマブ(1サイクル目)Day15 皮下30-120分前に加ナル、レスタミン、DEX投与					時間未定	
	エプキンリ皮下注 48mg/0.8mL/V	48 mg /Body					
	投与翌日から3日間、DEX16mg内服						
4	SC 皮下注射 エプコリタマブ(1サイクル目)Day22 皮下30-120分前に加ナル、レスタミン、DEX投与						時間未定
	エプキンリ皮下注 48mg/0.8mL/V	48 mg /Body					
	投与翌日から3日間、DEX16mg内服						

病名 : ①びまん性大細胞型、高悪性度、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫②再発または難治性の濾胞性リンパ腫

レジメンセット名 : エプコリタマブ(2-3サイクル目)

1コース期間(休業期間含む) 日 上限 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
1	SC 皮下注射 エプコリタマブ(2-3サイクル目) DEX使用の際は、皮下30-120分前と投与翌日から3日間			時間未定	時間未定	時間未定	時間未定
	エプキンリ皮下注 48mg/0.8mL/V	48 mg /Body					

病名 : ①びまん性大細胞型、高悪性度、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫②再発または難治性の濾胞性リンパ腫

レジメンセット名 : エブコリタマブ(4-9サイクル目)

1コース期間(休業期間含む) 28 日 上限 コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(15)
1	SC 皮下注射 エブコリタマブ(4-9サイクル目) DEX使用の際、皮下30-120分前と投与翌日 から3日間。			時間未定	時間未定
	エブキンリ皮下注 48mg/0.8mL/V	48 mg /Body			

病名 : ①びまん性大細胞型、高悪性度、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫②再発または難治性の濾胞性リンパ腫

レジメンセット名 : エブコリタマブ(10サイクル目以降)

1コース期間(休業期間含む) 28 日 上限 コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	SC 皮下注射 エブコリタマブ(10サイクル目以降) DEX使用の際、皮下30-120分前と投与翌日 から3日間。			時間未定
	エブキンリ皮下注 48mg/0.8mL/V	48 mg /Body		