

病名 : 高リスクの急性骨髄性白血病

レジメンセット名 : ビキセオス(寛解導入1コース目)

1コース期間(休薬期間含む) 日 上限 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)	day(5)
1	DIV 点滴注射 ビキセオス(寛解導入1コース目)			時間未定	時間未定	時間未定
	大塚生食注 50mL ルートキープ用	1本				
2	DIV 点滴注射 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル)	1本	15分で	時間未定	時間未定	時間未定
3	DIV 点滴注射 100U/m2 ビキセオス配合静注用	100 unit /m ²	90分で	時間未定	時間未定	時間未定
	フィルター使用不可 テルモ生食注 500mL 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V 注射用水19mLで溶解	1本 2 A				
4	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本		時間未定	時間未定	時間未定

病名 : 高リスクの急性骨髄性白血病

レジメンセット名 : ビキセオス(寛解導入2コース目)

1コース期間(休薬期間含む) 日 上限 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)
1	DIV 点滴注射 ビキセオス(寛解導入2コース目)			時間未定	時間未定
	大塚生食注 50mL ルートキープ用	1本			
2	DIV 点滴注射 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル)	1本	15分で	時間未定	時間未定
3	DIV 点滴注射 100U/m2 ビキセオス配合静注用	100 unit /m ²	90分で	時間未定	時間未定
	フィルター使用不可 テルモ生食注 500mL 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V 注射用水19mLで溶解	1本 2 A			
4	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本		時間未定	時間未定

病名 : 高リスクの急性骨髄性白血病

レジメンセット名 : ビキセオス(地固め)

1コース期間(休業期間含む) 日 上限 コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)
 1	DIV 点滴注射 ビキセオス(地固め療法) 大塚生食注 50mL ルートキープ用	1本		時間未定	時間未定
2	DIV 点滴注射 クラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL(先: カイトル)	1本	15分で	時間未定	時間未定
3	DIV 点滴注射 65U/m ² ビキセオス配合静注用 フィルター使用不可 テルモ生食注 500mL 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V 注射用水19mLで溶解	65 unit /m ² 1本 2 A	90分で	時間未定	時間未定
4	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本		時間未定	時間未定