



処方 コメント	3	DIV 点滴注射				時間未定	時間
		BD(triweekly)(静注)(d8,11) ルートキープ用					
		大塚生食注 50mL	1本				
	4	DIV 点滴注射		緩徐に静注		時間未定	時間
		側管より ベルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20mL 1Vあたり3mLで溶解し、シリンジ払出し	1.3 mg /m <sup>2</sup> 1 A				
注射							
	1	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
		BD(triweekly)(静注)(d22,25) ルートキープ用					
		大塚生食注 50mL	1本				
	2	DIV 点滴注射		緩徐に静注		時間未定	時間未定
		側管より ベルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20mL 1Vあたり3mLで溶解し、シリンジ払出し	1.3 mg /m <sup>2</sup> 1 A				
	3	DIV 点滴注射					時間未定 時間
		BD(triweekly)(静注)(d29,32) ルートキープ用					
		大塚生食注 50mL	1本				
	4	DIV 点滴注射		緩徐に静注			時間未定 時間
		側管より ベルケイド注射用 3mg 大塚生食注 20mL 1Vあたり3mLで溶解し、シリンジ払出し	1.3 mg /m <sup>2</sup> 1 A				
	処方 コメント						

sy(11)

間未定

間未定

sy(11)

間未定

訂未定

訂未定

訂未定

訂未定