

病名 : びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

レジメンセット名 : Pola BR

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

| 分類 | GpNo. | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(3) |
|----|-------|--|------------------------------------|---|---------------------|--------|-----------|
| 注射 | 1 | DIV 点滴注射 Pola BR(day1) ラインキープ用 大塚生食注 50mL カロナール・ポララミン内服 | 1本 | | 時間未定 | | |
| | 2 | DIV 点滴注射 1mg/mLに調製 375mg/m ² リツキサン点滴静注 500mg テルモ生食注 500mL 大塚生食注 100mL | 375 mg /m ² 1本 1本 | 1時間毎に 25mL/時→ 100mL/時→ 200mL/時で上 げる | 時間未定 | | |
| | 3 | DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL | 1本 | リツキサンと同じ速 度で | 時間未定 | | |
| | 4 | DIV 点滴注射 Pola BR(day2) ラインキープ用 大塚生食注 50mL 閉塞性器具を使用 | 1本 | | | 時間未定 | |
| | 5 | DIV 点滴注射 Pola BR(day3) ラインキープ用 大塚生食注 50mL 閉塞性器具を使用 | 1本 | | | | 時間未定 |
| | 6 | DIV 点滴注射 ソル・コーテフ注射用 100mg/V 大塚生食注 50mL 閉塞性器具を使用 | 1V 1本 | | 15分で | | 時間未定 |
| | 7 | IV 静脈内注射 インラインフィルターを使用 閉塞性器具を使用 ホラ化 TM 点滴静注用140mg (20mg/mL) 1.8mg/kg 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V 注射用水で30mgV/1.8mL,140mgV/7.2mLで 溶解(20mg/mL) 大塚生食注 100mL | 1.8 mg /kg 1A 1本 | | 初回90分、2回 目以降30分で | | 時間未定 |
| | 8 | DIV 点滴注射 経過観察用 大塚生食注 100mL 閉塞性器具を使用 | 1本 | | 30分で | | 時間未定 |
| | 9 | DIV 点滴注射 | | | 15分で | | 時間未定 時間未定 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------------|------|--|------|------|
| | 閉塞性器具を使用 | | | | 時間未定 | 時間未定 |
| | グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先 カトリル) | 1本 | | | | |
| | デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先デカトロン) | 1.5V | | | | |
| 10 | IV 静脈内注射 | | 60分で | | 時間未定 | 時間未定 |
| | 90mg/m ² 閉塞性器具を使用 | | | | | |
| | トリアキソ点滴静注液 100mg/4mL | 90 mg /m ² | | | | |
| | 大塚生食注 250mL | 1本 | | | | |
| 11 | DIV 点滴注射 | | 全開で | | 時間未定 | 時間未定 |
| | フラッシュ用 | | | | | |
| | 大塚生食注 50mL | 1本 | | | | |
| | 閉塞性器具を使用 | | | | | |
| 処方 コメント | | | | | | |