

病名 : 非ホジキンリンパ腫

レジメンセット名 : THP-COP

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 コース

| 分類 | GpNo. | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) |
|----|-------|--|------------------------------|---------|--------|
| 注射 | 1 | DIV 点滴注射 THP-COP 閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL ルートキープ用 | 1本 | | 時間未定 |
| | 2 | DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 パロ/セトロン点滴静注パック0.75mg/50mL (アロキン) | 1本 | 15分で | 時間未定 |
| | 3 | IV 静脈内注射 閉塞性器具を使用 ピノルビン注射用 30mg/V ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 100mL 50mg/m ² | 50 mg /m ² 1本 | 30分で | 時間未定 |
| | 4 | DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 オンコピン注 1mg/V 大塚生食注 50mL 1.4mg/m ² (MAX2mg/body) | 1.4 mg /m ² 1本 | 15分で | 時間未定 |
| | 5 | DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 エンドキサン注射用 100mg/V 大塚生食注 250mL 750mg/m ² | 750 mg /m ² 1本 | 2時間で | 時間未定 |
| | 6 | DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL フラッシュ用 | 1本 | 全開で | 時間未定 |
| | 処方 | | | | |
| | コメント | | | | |