病　名　　：　　ホジキンリンパ腫

レジメンセット名　：　A-AVD

1コース期間（休薬期間含む）　14　日　上限

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
	1	DIV　点滴注射			時間未定
		A-AVD ルートキープ用			
		大塚生食注 50mL	1 本		
	2	DIV　点滴注射		15分で	時間未定
		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL (アロキシ)	1 本		
	3	DIV　点滴注射		30分で	時間未定
		ドキソルビシン塩酸塩注射用 「NK」10mg/V(アドリアシン)	25 mg /m²		
		25mg/m2			
		大塚生食注 50mL	1 本		
	4	DIV　点滴注射		30分で	時間未定
		エクザール注射用 10mg/V	6 mg /m²		
		6mg/m²(MAX10mg/body)			
		大塚生食注 50mL	1 本		
注射	5	DIV　点滴注射		30分で	時間未定
		点滴ルート遮光 調製・搬送時も遮光			
		ダカルバジン注用 100mg	375 mg /m²		
		375mg/m2			
		注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V	4 A		
		1Vあたり10mLで溶解			
		大塚生食注 100mL	1 本		
	6	DIV　点滴注射		60分で	時間未定
		アドセトリス点滴静注液 50mg	1.2 mg /kg		
		1.2mg/kg			
		注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V	2 A		
		1Vあたり10.5mLで溶解(濃度5mg/mL)			
		大塚生食注 100mL	1 本		
	7	DIV　点滴注射		全開で	時間未定
		フラッシュ用			
		大塚生食注 50mL	1 本		
処方					
コメント					