病　名　　：乳癌

レジメンセット名　：〔乳癌)TC療法

1コース期間(休薬期間含む)　21　日　上限　4　コース

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV　点滴注射		30分で	時間未定
		TC療法(乳癌) 閉塞性器具を使用			
		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL(先:ｶｲﾄﾘﾙ)	1 本		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ)	1 V		
	2	IV　静脈内注射			時間未定
		側管より グラニセトロン投与中に			
		ポララミン注 5mg/1mL/A	1 A		
	3	DIV　点滴注射		60分で	時間未定
		閉塞性器具を使用			
		ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注液「EE」80mg/4mL(先:ﾀｷｿﾃｰﾙ)	75 mg /m²		
		75mg/m²			
		大塚生食注 250mL	1 本		
	4	DIV　点滴注射		30分で	時間未定
		閉塞性器具を使用			
		エンドキサン注射用 500mg/V	600 mg /m²		
		600mg/m²			
		大塚生食注 250mL	1 本		
	5	DIV　点滴注射		全開で	時間未定
		閉塞性器具を使用			
		大塚生食注 50mL	1 本		
処方					
ｺﾒﾝﾄ					