

病名 : 切除不能・再発乳癌

レジメンセット名 : wPTX+BV

1コース期間(休薬期間含む) 28 日 上限 PDまで コース

【day1,15】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 wPTX+BV ①コース:28日		15分	時間未定
		グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先:カイトリル)	1本		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デカトロン)	1.5V		
		初回3V、2回目~1.5V			
	2	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		15分で			
		ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー)	1A		
		ボララミン注 5mg/1mL/A	1A		
		大塚生食注 50mL	1本		
	3	DIV 点滴注射		1時間で	時間未定
		パクリタキセル注「ホスピール」 30mg/5mL/V(タキソール)	90 mg /m ²		
		90mg/m ²			
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
	4	DIV 点滴注射		90分→60分→30分	時間未定
		初回90分、2回目60分、3回目~30分			
	アバチン点滴静注用 400mg/16mL/V	10 mg /kg			
	10mg/kg				
	大塚生食注 100mL	1本			
5	DIV 点滴注射		15分	時間未定	
	ルートフラッシュ用				
	大塚生食注 50mL	1本			
処方 コメント					

【day8】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 wPTX+BV Day8 ①コース:28日		15分	時間未定
		グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先:カイトリル)	1本		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デカトロン)	1.5V		
		初回3V、2回目~1.5V			
	2	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー)	1A		
		ボララミン注 5mg/1mL/A	1A		
		大塚生食注 50mL	1本		
	3	DIV 点滴注射		1時間で	時間未定
		パクリタキセル注「ホスピール」 30mg/5mL/V(タキソール)	90 mg /m ²		
		90mg/m ²			
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
		大塚生食注 100mL	1本		
		大塚生食注 50mL	1本		

	30mg/5mL/V(タキソール)			
	90mg/m2			
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
	4 DIV 点滴注射		15分	時間未定
	ルートフラッシュ用			
	大塚生食注 50mL	1本		
処方				
コメント				