

病名 : 切除不能・再発乳がん

レジメンセット名 : パージェタ+DTX+HER

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 PDまで コース

【初回】

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 パージェタ84+DTX75+HER8 ルート確保用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 パージェタ点滴静注 420mg/14mL/V 840mg/body 大塚生食注 250mL	2V /Body 1本	60分	時間未定	
		初回60分、2回目以降30分				
	3	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL 経過観察	1本	30分	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 開始30分前に加ナル錠内服 ハーセプチン注射用60 60mg/V(21mg/mL) 8mg/kg 大塚生食注 250mL	8 mg /kg 1本	90分	時間未定	
		初回90分、2回目以降30分				
	5	DIV 点滴注射 グラニセロン点滴静注パック 1mg/50mL(先: カイトル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テクトロン)	1本 1V	15分	時間未定	
	6	DIV 点滴注射 トセタキセル点滴静注液 EEJ80mg/4mL(先: タキソール) 75mg/m2 大塚生食注 250mL	75 mg /m ² 1本	60分	時間未定	
	7	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	15分	時間未定	
	処方					
	コメント					

【2回目以降】

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 パージェタ42+DTX75+HER6 ルート確保用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 パージェタ点滴静注 420mg/14mL/V 420mg/body 大塚生食注 250mL	1V /Body 1本	30分	時間未定
		初回60分、2回目以降30分			

		初回90分、2回目以降30分			
注射	3	DIV 点滴注射		30分	時間未定
		開始30分前に加ナル2錠内服			
		ハーセプチン注射用60 60mg/V(21mg/mL)	6 mg /kg		
		6mg/kg			
		大塚生食注 250mL	1 本		
		初回90分、2回目以降30分			
注射	4	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		グラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL(先: カイトル)	1 本		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テクトロン)	1 V		
注射	5	DIV 点滴注射		60分	時間未定
		トセタキセル点滴静注射液「EE」80mg/4mL(先: タキセル)	75 mg /m ²		
		75mg/m ²			
		大塚生食注 250mL	1 本		
注射	6	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		大塚生食注 50mL	1 本		
処方					
コメント					