

病名 : 乳がん

レジメンセット名 : HER+PER+PTX

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 PDまで コース

**【初回 day1】**

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 HER+PER+wPTX【初回】(day1) ルート確保用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 開始30分前に加ナル2錠内服 パージェタ点滴静注 420mg/14mL/V 840mg/body 大塚生食注 250mL 初回60分、2回目以降30分	2 V /Body 1本	60分	時間未定	
	3	DIV 点滴注射 トラスツスマブBS点滴静注用 「CTH」150mg(ハーセプチン) 8mg/kg 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V 大塚生食注 250mL 初回90分、2回目以降30分	8 mg /kg 2 A 1本	90分	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 クラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL(先: カイトル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先行カイトロン)	1本 3 V	15分	時間未定	
	5	DIV 点滴注射 ファモチジン注射用 20mg/A(前カモファー) ポララミン注 5mg/1mL/A 大塚生食注 50mL	1 A 1 A 1本	15分	時間未定	
	6	DIV 点滴注射 パクリタキセル注「ホスピール」 100mg/16.7mL/V(タキソール) 80mg/m <sup>2</sup> ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	80 mg /m <sup>2</sup> 1本	60分で	時間未定	
	7	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	全開で	時間未定	
	処方					
	コメント					

**【2回目以降 day1】**

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
	1	DIV 点滴注射 HER+PER+wPTX【2回目以降】(day1) ルート確保用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 開始30分前に加ナル2錠内服		60分	時間未定

		開始30分前追加アール250ml内服			
		パージェタ点滴静注 420mg/14mL/V	1 V /Body		
		420mg/body			
		大塚生食注 250mL	1 本		
		初回60分、2回目以降30分			
注射	3	DIV 点滴注射		90分	時間未定
		トラスツスマブ <sup>®</sup> BS点滴静注用 〔CTH〕150mg(ハーセフチン)	6 mg /kg		
		6mg/kg			
		注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V	2 A		
		大塚生食注 250mL	1 本		
		初回90分、2回目以降30分			
		4	DIV 点滴注射		15分
		グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル)	1 本		
		デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1.5 V		
	5	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		ファモチジン注射用 20mg/A(前カモファー)	1 A		
		ポララミン注 5mg/1mL/A	1 A		
		大塚生食注 50mL	1 本		
	6	DIV 点滴注射		60分で	時間未定
		ハツリタキセル注「ホスピール」 100mg/16.7mL/V(タキソール)	80 mg /m <sup>2</sup>		
		80mg/m <sup>2</sup>			
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1 本		
	7	DIV 点滴注射		全開で	時間未定
		大塚生食注 50mL	1 本		
処方					
コメント					

### 【2回目以降 day8,15】

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		HER+PER+wPTX(day8,15)			
		グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル)	1 本		
		デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1.5 V		
	2	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		ファモチジン注射用 20mg/A(前カモファー)	1 A		
		ポララミン注 5mg/1mL/A	1 A		
		大塚生食注 50mL	1 本		
	3	DIV 点滴注射		60分で	時間未定
		ハツリタキセル注「ホスピール」 100mg/16.7mL/V(タキソール)	80 mg /m <sup>2</sup>		
		80mg/m <sup>2</sup>			
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1 本		
	4	DIV 点滴注射		全開で	時間未定
	大塚生食注 50mL	1 本			
処方					
コメント					