

病名 : 乳がん

レジメンセット名 : 1週毎PTX+HER2

1コース期間(休薬期間含む) 7 日 上限 _____

【初回】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		【初回】1週毎PTX+HER2 ①コース:7日			
		グラニセロン点滴静注パック 1mg/50mL(先:カイトル)	1本		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デキサトロン)	3V		
	2	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		15分で			
		ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー)	1A		
		ポラミン注 5mg/1mL/A	1A		
		大塚生食注 50mL	1本		
	3	DIV 点滴注射		1時間で	時間未定
		1時間で			
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
		パツタキセル注「ホスピーラ」 30mg/5mL/V(タキソール)	80 mg /m ²		
		80mg/m ²			
	4	DIV 点滴注射		90分で	時間未定
	開始30分前に加ナル2錠服用				
	ハーセプチン注射用60 60mg/V(21mg/mL)	4 mg /kg			
	4mg/kg				
	大塚生食注 250mL	1本			
5	DIV 点滴注射		15分	時間未定	
	フラッシュ用				
	大塚生食注 50mL	1本			
処方 コメント					

【2回目以降】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		1週毎PTX+HER2(2回目以降) ①コース:7日			
		グラニセロン点滴静注パック 1mg/50mL(先:カイトル)	1本		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デキサトロン)	1.5V		
	2	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー)	1A		
		ポラミン注 5mg/1mL/A	1A		
		大塚生食注 50mL	1本		
	3	DIV 点滴注射		1時間で	時間未定
		1時間で			
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		

		パロキサセル注「ホスピール」 30mg/5mL/V(タキソール)	80 mg /m ²		
		80mg/m ²			
	4	DIV 点滴注射		30分	時間未定
		開始30分前に加ナル2錠服用 2mg/kg			
		ハーセプチン注射用60 60mg/V(21mg/mL)	2 mg /kg		
		大塚生食注 250mL	1 本		
	5	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		フラッシュ用			
		大塚生食注 50mL	1 本		
処方					
コメント					