病　名　：　PD-1陽性ﾄﾘﾌﾟﾙﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ乳癌

レジメンセット名　：　ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+GEM+CBDCA

1コース期間（休薬期間含む）　21　日　上限　PDまで　コース

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
	1	DIV　点滴注射		5～10分	時間未定	
		ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+GEM+CBDCA(day1) インターバル:21日				
		大塚生食注 50mL	1 本			
		ルートキープ用				
	2	DIV　点滴注射		30分で	時間未定	
		インラインフィルターを使用				
		大塚生食注 100mL	1 本			
		キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V	200 mg /Body			
	3	DIV　点滴注射		全開で	時間未定	
		フラッシュ用				
		大塚生食注 50mL	1 本			
	4	DIV　点滴注射				時間未定
		ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ+GEM+CBDCA(day8)				
		大塚生食注 50mL	1 本			
注射		ルートキープ用				
	5	DIV　点滴注射		15分で	時間未定	時間未定
		ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL (アロキシ)	1 本			
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ)	1 V			
	6	DIV　点滴注射		30分で	時間未定	時間未定
		ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ点滴静注用 「ﾔｸﾙﾄ」200mg/V(ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ	1000 mg /m²			
		1000mg/m2				
		大塚生食注 100mL	1 本			
	7	DIV　点滴注射		1時間で	時間未定	時間未定
		カルボプラチン注「NK」 450mg/45mL/V	2 mg /GFR+25			
		AUC=2				
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1 本			
	8	DIV　点滴注射		全開で	時間未定	時間未定
		フラッシュ用				
		大塚生食注 50mL	1 本			
処方						
ｺﾒﾝﾄ						