

病名 : トリプルネガティブ乳がん

レジメンセット名 : ヘムフロリスマブ+EC

1コース期間(休業期間含む) 21 日 上限 4 コース

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 ヘムフロリスマブ+EC 閉塞性器具を使用 大塚生食注 50mL メインルート	1本	5~10分	時間未定
	2	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート、インラインフィルターを使用 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V 200mg/body 大塚生食注 100mL	200 mg /Body 1本	30分	時間未定
	3	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート 大塚生食注 50mL	1本	10~20分	時間未定
	4	DIV 点滴注射 ★アフリキシオン内服 側管より 大塚生食注 250mL	1本	10時間で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート パロセトン点滴静注パック0.75mg/50mL (アロキシ) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先デキサート)	1本 1V	15分で	時間未定
	6	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート ヒルヒツジ注 NKJ(先ファルモルピジン) 50mg/V 90mg/m2 大塚生食注 100mL	90 mg /m ² 1本	15分で	時間未定
	7	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート エンドキサン注射用 100mg/V 600mg/m2 大塚生食注 250mL	600 mg /m ² 1本	30分で	時間未定
	8	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート 大塚生食注 50mL	1本	全開で	時間未定