

病名 : 乳がん

レジメンセット名 : FEC100療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 4~6 コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 FEC100 側管より 大塚生食注 250mL	1本	1時間で	時間未定	
	2	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート アロキシ静注 0.75mg/5mL/V デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカト注) 大塚生食注 100mL	1V 1V 1本	15分で	時間未定	
	3	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート エリロピリン注 NKJ(先ファルモピリン) 50mg/V 100mg/m2 大塚生食注 100mL	100 mg /m <sup>2</sup> 1本	15分で	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート エンドキサン注射用 100mg/V 500mg/m2 大塚生食注 250mL	500 mg /m <sup>2</sup> 1本	30分で	時間未定	
	5	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V 500mg/m2 大塚生食注 50mL	500 mg /m <sup>2</sup> 1本	5分で	時間未定	
	6	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート 大塚生食注 50mL	1本	全開で	時間未定	
	処方					
	コメント					