

病名 : 治癒切除不能な進行・再発大腸がん

レジメンセット名 : FOLFIRI+アービタック療法

1コース期間(休薬期間含む) 14 日 上限 PDまで コース ス

【初回day1】

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 初回FOLFIRI+アービタックス ラインキープ用 大塚生食注 100mL	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 側管より ポララミン注 5mg/1mL/A	1 A		時間未定
	3	DIV 点滴注射 側管より デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先デキ注)	1 V		時間未定
	4	DIV 点滴注射 ポララミン終了30分後に開始 初回400mg/m <sup>2</sup> 大塚生食注 250mL アービタックス注射液 100mg/20mL/V	1本 400 mg /m <sup>2</sup>	2時間で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 ルートフラッシュ 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	6	DIV 点滴注射 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイレル)	1本	全開で	時間未定
	7	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注トローワ(先アイホリン)100mg/V 200mg/m <sup>2</sup>	1本 200 mg /m <sup>2</sup>	2時間で	時間未定
	8	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL イレタカ塩酸塩注トローワ 40mg/2mL/V(先: カンフト) 150mg/m <sup>2</sup>	1本 150 mg /m <sup>2</sup>	90分で	時間未定
	9	DIV 点滴注射 レボホリナート終了後に 大塚生食注 50mL フルオロウラシル注 250mg/5mL/V 400mg/m <sup>2</sup>	1本 400 mg /m <sup>2</sup>	全開で	時間未定
	10	V 静脈内局所持続注入 インフューザーポンプで		46時間	時間未定

【2回目以降day1】

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)

注射	1	DIV 点滴注射			時間未定
		2回目以降FOLFIRI+アビタックス ラインキープ用			
		大塚生食注 100mL	1本		
	2	DIV 点滴注射			時間未定
		側管より			
		ポララミン注 5mg/1mL/A	1A		
	3	DIV 点滴注射			時間未定
		側管より			
		デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先デキトロン)	1V		
	4	DIV 点滴注射		1時間で	時間未定
		ポララミン終了30分後に開始 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup>			
	大塚生食注 250mL	1本			
	アビタックス注射液 100mg/20mL/V	250 mg /m <sup>2</sup>			
5	DIV 点滴注射			時間未定	
	ルートフラッシュ				
	大塚生食注 50mL	1本			
6	DIV 点滴注射		全開で	時間未定	
	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先 カイトル)	1本			
7	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定	
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本			
	レボホリナート注トローワ(先アイホリン)100mg/V	200 mg /m <sup>2</sup>			
	200mg/m <sup>2</sup>				
8	DIV 点滴注射		90分で	時間未定	
	レボホリナートと同時に				
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本			
	イリナカ塩酸塩注トローワ 40mg/2mL/V(先 カンフト)	150 mg /m <sup>2</sup>			
	150mg/m <sup>2</sup>				
9	DIV 点滴注射		全開で	時間未定	
	レボホリナート終了後に				
	大塚生食注 50mL	1本			
	フルオロウラシル注 250mg/5mL/V	400 mg /m <sup>2</sup>			
	400mg/m <sup>2</sup>				
10	V 静脈内局所持続注入		46時間	時間未定	
	インフューザーポンプで				
	大塚生食注 100mL	1本			
	全量100mLで				
	フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V	2400 mg /m <sup>2</sup>			
	2400mg/m <sup>2</sup>				
11	IVH埋込型 中心静脈埋込型注射			時間未定	
	ポンプ終了時				
	ヘパフラッシュ 100単位/mLシリンジ 10mL	1筒			
処方 コメント					

【day8】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
					

注射	1	DIV 点滴注射			時間未定
		FOLFIRI+アセテック(Day8) ラインキープ			
		大塚生食注 50mL	1本		
	2	側 点滴注射(側管)			時間未定
		側管より			
		ボラミン注 5mg/1mL/A	1A		
	3	側 点滴注射(側管)			時間未定
		側管より			
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカトロン)	1V		
	4	DIV 点滴注射		60分で	時間未定
	テカトロン投与後30分から				
	アピタックス注射液 100mg/20mL/V	250 mg /m <sup>2</sup>			
	250mg/m <sup>2</sup>				
	大塚生食注 250mL	1本			
5	DIV 点滴注射		60分で	時間未定	
	大塚生食注 100mL	1本			
処方					
コメント					