

病名 : 大腸がん

レジメンセット名 : XELOX療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 8 コース

(術後化学療法の場合)

抗がん剤(商品名)及び用量・用法(1日投与量)				
抗がん剤名	投与量 mg/m <sup>2</sup>	設定%	設定理論量mg 理論量×設定%	Day
ゼローダ	2000	100%	0.0	day1-14
オキサリプラチン	130	100%	0.0	day1

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 ラインキープ用 大塚生食注 50mL XELOX	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 全開で グラニセトロン点滴静注パック <sup>®</sup> 1mg/50mL(先: カイトル) デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テクトロン)	1本 1V		時間未定
	3	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V 130mg/m <sup>2</sup>	1本 130 mg /m <sup>2</sup>	2時間で	時間未定
	4	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本	全開で	時間未定
	処方				
	コメント				