

病名 : 治癒切除不能な進行・再発大腸がん

レジメンセット名 : アフリベルセプト+FOLFIRI療法

1コース期間(休薬期間含む) 14 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 アフリベルセプト+FOLFIRI 大塚生食注 50mL ラインキープ用	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 グラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL(先: カイトル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テクトロン)	1本 1V	全開で	時間未定
	3	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	全開で	時間未定
	4	DIV 点滴注射 大塚生食注 250mL ザルトラップ点滴静注用 200mg/8mL/V 4mg/kg	1本 4 mg /kg	60分で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	全開で	時間未定
	6	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注トローワ(先:アイホリン)100mg/V 200mg/m ²	1本 200 mg /m ²	90分で	時間未定
	7	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL イリリカ塩酸塩注トローワ 40mg/2mL/V(先: カイト)	1本 150 mg /m ²	90分で	時間未定
	8	DIV 点滴注射 レボホリナート終了後 大塚生食注 50mL フルオロウラシル注 250mg/5mL/V 400mg/m ²	1本 400 mg /m ²	全開で	時間未定
	9	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	10	V 静脈内局所持続注入 インフューザーポンプ [®] で 全量100mLで 大塚生食注 100mL フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V 2400mg/m ²	1本 2400 mg /m ²	46時間	時間未定
	11	IVH 中心静脈注射 ポンプ終了時 ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒		時間未定

処方				
コボト				