

病名 : 治癒切除不能な進行・再発大腸がん

レジメンセット名 : ラムシルマブ+FOLFIRI療法

1コース期間(休業期間含む) 14 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 ラムシルマブ+FOLFIRI ラインキープ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカドロン) ポララミン注 5mg/1mL/A	1本 1V 1A	30分	時間未定
	3	DIV 点滴注射 蛋白質透過型フィルター Total250mL サイラムザ点滴静注液 500mg/50mL/V 8mg/kg 大塚生食注 250mL	8 mg /kg 1本	60分	時間未定
	4	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	全開	時間未定
	5	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注トワ(先:アイホリン)100mg/V 200mg/m2	1本 200 mg /m ²	2時間で	時間未定
	6	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL リナカン塩酸塩注トワ(先: カフト) 40mg/2mL/V(先: カフト) 150mg/m2	1本 150 mg /m ²	90分で	時間未定
	7	DIV 点滴注射 レボホリナート終了後 大塚生食注 50mL フルオロウラシル注 250mg/5mL/V 400mg/m2	1本 400 mg /m ²	全開で	時間未定
	8	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	9	DIV 点滴注射 フラッシュ用用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	10	V 静脈内局所持続注入 インフューサーホフ [®] で 全量100mLで 大塚生食注 100mL フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V 2400mg/m2	1本 2400 mg /m ²	46時間	時間未定

	11	IVH 中心静脈注射			時間未定
		ポンプ終了時			
		ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒		
処方					
コメント					