

病名 : 治癒切除不能な進行・再発大腸がん

レジメンセット名 : FOLFIRI+ベクティビックス療法

1コース期間(休業期間含む) 14 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 FOLFIRI+ベクティビックス療法 ラインキープ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 クラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL(先: カイトル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1V	全開で	時間未定
	3	DIV 点滴注射 インラインフィルター使用 大塚生食注 100mL ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL/V 6mg/kg	1本 6 mg /kg	1時間で	時間未定
	4	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	5	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注トワ [®] (先:アイホリン)100mg/V 200mg/m ²	1本 200 mg /m ²	2時間で	時間未定
	6	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL イリリカ [®] 塩酸塩注トワ [®] 40mg/2mL/V(先: カイト)	1本 150 mg /m ²	90分で	時間未定
	7	DIV 点滴注射 レボホリナート終了後に 大塚生食注 50mL フルオロウラシル注 250mg/5mL/V 400mg/m ²	1本 400 mg /m ²	全開で	時間未定
	8	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	9	V 静脈内局所持続注入 イクフェーザーポンプ [®] で 大塚生食注 100mL 全量100mLで フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V 2400mg/m ²	1本 2400 mg /m ²	46時間	時間未定
	10	IVH埋込型 中心静脈埋込型注射 ポンプ終了時			時間未定

	ヘパラチン 100単位/mLシリンジ 10mL	1 同		
処方				
コメント				