

病名 : 治癒切除不能な進行・再発大腸がん

レジメンセット名 : FOLFOX6+アービタックス療法

1コース期間(休業期間含む) 14 日 上限 PDまで コース

【初回day1】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 初回FOLFOX6+アービタックス ラインキープ用 大塚生食注 100mL	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 側管より ポララミン注 5mg/1mL/A	1 A		時間未定
	3	DIV 点滴注射 側管より デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先行カトロン)	1 V		時間未定
	4	DIV 点滴注射 ポララミン終了30分後に開始 初回400mg/m ² 大塚生食注 250mL	1本		2時間で 時間未定
			アービタックス注射液 100mg/20mL/V	400 mg /m ²	
	5	DIV 点滴注射 ルートフラッシュ 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	6	DIV 点滴注射 グラセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル)	1本		全開で 時間未定
	7	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		2時間で 時間未定
			レボホリナート注トワJ(先:アイソホリン)100mg/V	200 mg /m ²	
			200mg/m ²		
注射	8	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		2時間で 時間未定
		オキサリプラチン点滴静注液「NKJ」100mg/20mL/V	85 mg /m ²		
		85mg/m ²			
9	DIV 点滴注射 レボホリナート終了後に 大塚生食注 50mL	1本		全開で 時間未定	
		フルオロウラシル注 250mg/5mL/V	400 mg /m ²		
		400mg/m ²			
10	V 静脈内局所持続注入 インフューザーホフ [®] で 大塚生食注 100mL	1本		46時間 時間未定	
		全量100mLで フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V	2400 mg /m ²		
		2400mg/m ²			

	11	IVH埋込型 中心静脈埋込型注射			時間未定
		ポンプ終了時			
		ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒		
処方					
コメント					

【2回目以降day1】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 2回目以降FOLFOX+アビタックス ラインキープ用 大塚生食注 100mL	1本		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 側管より ポララミン注 5mg/1mL/A	1A		時間未定	
	3	DIV 点滴注射 側管より デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカトロン)	1V		時間未定	
	4	DIV 点滴注射 ポララミン終了30分後に開始 2回目以降 250mg/m ² 大塚生食注 250mL	1本	1時間で	時間未定	
			アビタックス注射液 100mg/20mL/V	250 mg /m ²		
	5	DIV 点滴注射 ルートフラッシュ 大塚生食注 50mL	1本		時間未定	
	6	DIV 点滴注射 クラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル)	1本		全開で 時間未定	
	注射	7	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注トワJ(先アイホリン)100mg/V	1本 200 mg /m ²	2時間で	時間未定
				200mg/m ²		
		8	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液「NKJ」100mg/20mL/V	1本 85 mg /m ²	2時間で	時間未定
		85mg/m ²				
9	DIV 点滴注射 レボホリナート終了後に 大塚生食注 50mL フルオロウラシル注 250mg/5mL/V	1本 400 mg /m ²	全開で	時間未定		
		400mg/m ²				
注射	10	V 静脈内局所持続注入 インフューザーポンプで 大塚生食注 100mL	1本	46時間	時間未定	
			全量100mLで			
			フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V	2400 mg /m ²		
		2400mg/m ²				
11					時間未定	

	11	IVH理込室 中心静脈理込室注射			時間未定
		ポンプ終了時			
		ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1 筒		
処方					
コメント					

【day8】

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 FOLFOX+アビタック(Day8) ラインキープ 大塚生食注 50mL	1 本		時間未定
	2	側 点滴注射(側管) 側管より ポラミン注 5mg/1mL/A	1 A		時間未定
	3	側 点滴注射(側管) 側管より デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカトロン)	1 V		時間未定
	4	DIV 点滴注射 テカトロン投与後30分から アビタックス注射液 100mg/20mL/V 250mg/m ² 大塚生食注 250mL	250 mg /m ² 1 本	60分で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 大塚生食注 100mL	1 本	60分で	時間未定
	処方				
	コメント				