

病名 : 治癒切除不能な進行・再発大腸がん

レジメンセット名 : FOLFOX6+アバステン(5)療法

1コース期間(休業期間含む) 14 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 FOLFOX6+アバステン(5) ラインキープ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 グラセプトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトリル) デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1V	全開で	時間未定
	3	DIV 点滴注射 初回90分、2回目60分、3回目~30分 大塚生食注 100mL アバステン点滴静注用 400mg/16mL/V 5mg/kg	1本 5 mg /kg	90分→60分→ 30分	時間未定
	4	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注トローリ(先:アイボリン)100mg/V 200mg/m2	1本 200 mg /m ²	2時間で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V 85mg/m2	1本 85 mg /m ²	2時間で	時間未定
	6	DIV 点滴注射 オキサリプラチン終了後 大塚生食注 50mL フルオロウラシル注 250mg/5mL/V 400mg/m2	1本 400 mg /m ²	全開で	時間未定
	7	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	8	V 静脈内局所持続注入 インフューザーホフで 大塚生食注 100mL 全量100mLで フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V 2400mg/m2	1本 2400 mg /m ²	46時間	時間未定
	9	IVH埋込型 中心静脈埋込型注射 ポンプ終了時 へパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒		時間未定
	処方				