

病名 : 治癒切除不能な進行・再発大腸癌

レジメンセット名 : FOLFOXIRI+BV療法

1コース期間(休薬期間含む) 14 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 FOLFOXIRI+BV ラインキープ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL アロキシ静注 0.75mg/5mL/V デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先デカトロン)	1本 1V 1.5V	全開で	時間未定
	3	DIV 点滴注射 大塚生食注 100mL アバステン点滴静注用 400mg/16mL/V 5mg/kg	1本 5 mg /kg	90分→60分→ 30分	時間未定
	4	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V 85mg/m <sup>2</sup>	1本 85 mg /m <sup>2</sup>	2時間で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 イリノテカンと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注トローワ(先アイホリン)100mg/V 200mg/m <sup>2</sup>	1本 200 mg /m <sup>2</sup>	90分で	時間未定
	6	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL イリノテカン塩酸塩注トローワ 40mg/2mL/V(先 カプト) 150mg/m <sup>2</sup>	1本 150 mg /m <sup>2</sup>	90分で	時間未定
	7	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	8	V 静脈内局所持続注入 インフューザーポンプで 大塚生食注 100mL 全量100mLで フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V 3000mg/m <sup>2</sup>	1本 3000 mg /m <sup>2</sup>	468時間	時間未定
	9	IVH 中心静脈注射 ポンプ終了時 ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒		時間未定
	処方				
	コメント				