

病名 : 切除不能再発 大腸癌

レジメンセット名 : IRIS+アバスチン療法

1コース期間(休薬期間含む) 28 日 上限 PDまで コース

抗がん剤(商品名)及び用量・用法(1日投与量)				
抗がん剤名	投与量 mg/m ² or kg	設定%	設定理論量mg 理論量×設定%	Day
TS-1(1.25m ² 未満)			80mg/body/day	day1-14
1日用量(分2)				
TS-1(1.25m ² 以上~1.5m ² 未満)			100mg/body/day	
1日用量(分2)				15-28 休薬
TS-1(1.5m ² 以上)			120mg/body/day	
1日用量(分2)				
アバスチン	5	100%	0.0	day1.15
イリノテカン	100	100%	0.0	day1.15

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射		30分	時間未定
		IRIS+アバスチン療法 TS-1:Day1-14			
		グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カトリル)	1本		
		1コース:28日			
		デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1.5V		
	2	DIV 点滴注射		90分→60分→ 30分	時間未定
		初回90分、2回目60分、3回目~30分			
		大塚生食注 100mL	1本		
		アバスチン点滴静注用 400mg/16mL/V	5mg/kg		
		5mg/kg			
	3	DIV 点滴注射		90分	時間未定
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
		リ/テカ塩酸塩注トローワ 40mg/2mL/V(先: カント)	100mg/m ²		
		100mg/m ²			
	4	DIV 点滴注射		15分	時間未定
		フラッシュ用			
	大塚生食注 50mL	1本			
処方 コメント					