

病名 : 切除不能・進行再発 大腸癌

レジメンセット名 : SOX+アバステン療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 PDまで コース

抗がん剤(商品名)及び用量・用法(1日投与量)				
抗がん剤名	投与量 mg/m ² or kg	設定%	設定理論量mg 理論量×設定%	Day
TS-1(1.25ml未満) 1日用量(分2)			80mg/body/day	day1-14 15-21 休薬
TS-1(1.25ml以上~1.5ml未満) 1日用量(分2)			100mg/body/day	
TS-1(1.5ml以上) 1日用量(分2)			120mg/body/day	
アバステン	7.5	100%	0.0	day1
オキサリプラチン	130	100%	0.0	day1

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 ラインキープ用 大塚生食注 100mL SOX+Bevacizumab療法			時間未定
	2	DIV 点滴注射 全開で グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL(先 カイトル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカトロン)	1本 1V		時間未定
	3	DIV 点滴注射 初回90分 2回目60分 3回目以降30分 アバステン点滴静注用 100mg/4mL/V 7.5mg/kg 大塚生食注 100mL	7.5 mg /kg 1本	90分→60分→ 30分	時間未定
	4	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V 130mg/m ²	1本 130 mg /m ²	2時間で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL 全開で	1本		時間未定
	処方				
	コメント				