

病名 : 胃癌

レジメンセット名 : ハーセプチン+SP療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

(シスプラチンのみ)

抗がん剤(商品名)及び用量・用法(1日投与量)				
抗がん剤名	投与量 mg/m <sup>2</sup> or kg	設定%	設定理論量mg 理論量×設定%	Day
S-1	80	100%	0.0	day1-14
ハーセプチン 初回	8	100%	0.0	day1
ハーセプチン 2回目以降	6	100%	0.0	day1
シスプラチン	60	100%	0.0	day1

【初回】

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	DIV 点滴注射 S-1 80mg/m <sup>2</sup> Day1-14 2 時間で ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF) 初回ハーセプチン+SP療法	1本	day1 2時間で	時間未定		
	2	DIV 点滴注射 2 時間で テルモ生食注 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL【要希釈】	1本 1A	day1 2時間で	時間未定		
	3	DIV 点滴注射 2 時間で テルモ生食注 500mL	1本	day1 2時間で	時間未定		
	4	DIV 点滴注射 8mg/kg 90 分で ハーセプチン注射用60 60mg/V(21mg/mL) 大塚生食注 250mL	8 mg /kg 1本	day1 90分で	時間未定		
	5	DIV 点滴注射 ハーセプチン終了後 アロキシ静注 0.75mg/5mL/V デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デカトロン) 大塚生食注 100mL	1V 1.5V 1本	day1 30分で	時間未定		
	6	DIV 点滴注射 全量を500mLに調製 シスプラチン10時間前コイマト服用 2 時間で テルモ生食注 500mL シスプラチン注「日医工」10mg/20mL/V 60mg/m <sup>2</sup>	500 ml 60 mg /m <sup>2</sup>	day1 2時間で	時間未定		
	7	DIV 点滴注射 1 時間で マンニトールS注射液 300mL シスプラチン投与後	1本	day1 1時間で	時間未定		
	8	DIV 点滴注射		day1 2時間で	時間未定		

		2 時間で						
		テルモ生食注 500mL	1 本					
9	DIV 点滴注射			day1 2時間で	時間未定			
		2 時間で						
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1 本					
10	DIV 点滴注射			day2 30分で	時間未定	時間未定		
		30 分で						
		大塚生食注 100mL	1 本					
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトコ)	1 V					
11	DIV 点滴注射			day2 2時間で	時間未定	時間未定		
		2 時間で						
		テルモ生食注 500mL	1 本					
12	DIV 点滴注射			day2 2時間で	時間未定	時間未定		
		2 時間で						
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1 本					
13	DIV 点滴注射			day2 2時間で	時間未定	時間未定		
		2 時間で						
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1 本					
処方								
コメント								

## 【2回目以降】

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	DIV 点滴注射 TS-1 80mg/m <sup>2</sup> Day1-14 2 時間で ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF) 【2回目以降】ハーセプチン+SP療法	1 本	day1 2時間で	時間未定		
	2	DIV 点滴注射 2 時間で テルモ生食注 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL【要希釈】	1 本 1 A	day1 2時間で	時間未定		
	3	DIV 点滴注射 2 時間で テルモ生食注 500mL	1 本	day1 2時間で	時間未定		
	4	DIV 点滴注射 6mg/kg 30 分で ハーセプチン注射用60 60mg/V(21mg/mL) 大塚生食注 250mL	6 mg /kg 1 本	day1 30分で	時間未定		
	5	DIV 点滴注射 ハーセプチン終了後 アロキシ静注 0.75mg/5mL/V デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトコ) 大塚生食注 100mL	1 V 1.5 V 1 本	day1 30分で	時間未定		
	6	DIV 点滴注射 全量を500mLに調製 シスプラチン1時間前にイモト服用 2 時間で テルモ生食注 500ml	500 ml	day1 2時間で	時間未定		

		ソルアセトF輸液 500mL	500 mL			
		シスプラチン注「日医工」10mg/20mL/V	60 mg /m <sup>2</sup>			
		60mg/m <sup>2</sup>				
注射	7	DIV 点滴注射		day1 1時間で	時間未定	
		1 時間で				
		マンニトールS注射液 300mL	1 本			
		シスプラチン投与後				
	8	DIV 点滴注射		day1 2時間で	時間未定	
		2 時間で				
		テルモ生食注 500mL	1 本			
	9	DIV 点滴注射		day1 2時間で	時間未定	
		2 時間で				
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1 本			
	10	DIV 点滴注射		day2 30分で	時間未定	時間未定
		30 分で				
		大塚生食注 100mL	1 本			
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトリン)	1 V				
11	DIV 点滴注射		day2 2時間で	時間未定	時間未定	
	2 時間で					
	テルモ生食注 500mL	1 本				
12	DIV 点滴注射		day2 2時間で	時間未定	時間未定	
	2 時間で					
	ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1 本				
13	DIV 点滴注射		day2 2時間で	時間未定	時間未定	
	2 時間で					
	ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1 本				
処方						
コメント						