病名: **切除不能·再発胃癌**

レジメンセット名 : **ラムシルマブ+PTX療法**

1コース期間(休薬期間含む) 28 日 上限 PDまで コース

分類	GpNα	<u>薬剤/手技</u>	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	/						
	1	DIV 点滴注射		15分	時間未定	時間未定	時間未定
		ラムシルマブ + PTX療法 ①コース: 28日					
		ケラニセトロン点:高計注ハッケ 1mg/50mL(先:カイトリル)	1本				
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先;かかつ)	1 V				
	2	DIV 点滴注射		15分	時間未定	時間未定	時間未定
		15 分で					
		ファモチジン注射用 20mg/A(前:カモファー)	1 A				
		ポララミン注 5mg/1mL/A	1 A				
		大塚生食注 50mL	1本				
	3	DIV 点滴注射		60分	時間未定		時間未定
		Total 250mL					
		サイラムザ点流静注液 500mg/50mL/V	8 mg/kg				
		8mg/kg					
		大塚生食注 250mL	1本				
	4	DIV 点滴注射		全開	時間未定		時間未定
		大塚生食注 50mL	1本				
	5	DIV 点滴注射		60分	時間未定	時間未定	時間未定
		パ [®] ウリタキセル注:「ホスヒ [®] ーラ」 30mg/5mL/V(タキソール)	80 mg/m²				
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本				
	6	DIV 点滴注射		15分	時間未定	時間未定	時間未定
		大塚生食注 50mL	1本				
処方 コメント							