

病名 : CLDN18.2陽性の切除不能、進行再発の胃がん

レジメンセット名 : ゾルパツキシマフ+mFOLFOX6(初回)

1コース期間(休業期間含む) 14 日 上限 1 コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 ゾルパツキシマフ+mFOLFOX6(初回) 大塚生食注 50mL ルートキープ用	1本		時間未定
2	DIV 点滴注射 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL(アキソ) デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカトロン) ボラミン注 5mg/1mL/A アロカリス点滴静注用235mg/V	1本 1V 1A 1V	30分で	時間未定
3	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	15分	時間未定
4	DIV 点滴注射 希釈後、2mg/mLとなるように調製。 ピロイ点滴静注用 100mg/V 800mg/m2 テルモ生食注 500mL 注射用水 100mL(光製薬) 1Vあたり水5mLで溶解	800 mg /m ² 1本 1本	指示コメントに従う	時間未定
5	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	Rp4)と同速度で	時間未定
6	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注(トワ)(先アイホリソ)100mg/V 200mg/m2	1本 200 mg /m ²	2時間で	時間未定
7	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL オキサプラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V 85mg/m2	1本 85 mg /m ²	2時間で	時間未定
8	DIV 点滴注射 オキサプラチン終了後 大塚生食注 50mL フルオロウラシル注 250mg/5mL/V 400mg/m2	1本 400 mg /m ²	全開で	時間未定
9	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
10	V 静脈内局所持続注入 インフューザーホップで 大塚生食注 100mL 全量100mLで フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V 2400mg/m2	1本 2400 mg /m ²	46時間	時間未定
11	IVH 中心静脈注射 ポンプ終了時 【中心静脈】へフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒		時間未定

病名 : CLDN18.2陽性の切除不能、進行再発の胃がん

レジメンセット名 : ゾルパツキシマブ+mFOLFOX6(2回目以降)

1コース期間(休業期間含む) 14 日 上限 コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 ゾルパツキシマブ+mFOLFOX6(2回目以降)			時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
	ルートキープ用			
2	DIV 点滴注射		30分で	時間未定
	パロセトロン点滴静注パッケ0.75mg/50mL (アロキソ)	1本		
	デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先デキサソ)	1V		
	アロカリス点滴静注用235mg/V	1V		
3	DIV 点滴注射		15分	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
4	DIV 点滴注射		指示コメントに従う	時間未定
	希釈後、2mg/mLとなるように調製。 ピロイ点滴静注用 100mg/V	400 mg /m ²		
	400mg/m ²			
	テルモ生食注 500mL	1本		
	注射用水 100mL(光製薬)	1本		
	1Vあたり水5mLで溶解			
5	DIV 点滴注射		Rp4)と同速度で	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
6	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
	レボホリナート注トワ(先アイホリ)100mg/V	200 mg /m ²		
	200mg/m ²			
7	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定
	レボホリナートと同時に			
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
	オキサフラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V	85 mg /m ²		
	85mg/m ²			
8	DIV 点滴注射		全開で	時間未定
	オキサフラチン終了後			
	大塚生食注 50mL	1本		
	フルオロウラシル注 250mg/5mL/V	400 mg /m ²		
	400mg/m ²			
9	DIV 点滴注射			時間未定
	フラッシュ用			
	大塚生食注 50mL	1本		
10	V 静脈内局所持続注入		46時間	時間未定
	インフューザーホックで			
	大塚生食注 100mL	1本		
	全量100mLで			
	フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V	2400 mg /m ²		
	2400mg/m ²			
11	IVH 中心静脈注射			時間未定
	ポンプ終了時			
	【中心静脈】へハフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒		