

病名 : CLDN18.2陽性の切除不能、進行再発の胃がん

レジメンセット名 : ゾルヘツキシマフ+CapeOX(初回)

1コース期間(休薬期間含む) 日 上限 コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 カヘツシマフ2000mg/m ² /Day Day 1-14 ゾルヘツキシマフ+CapeOX(初回)			時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
	ルートキーフ用			
2	DIV 点滴注射		30分で	時間未定
	パロセトロン点滴静注パッケ0.75mg/50mL (アロキソ)	1本		
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先デカトロン)	1V		
	ボララミン注 5mg/1mL/A	1A		
	アロカリス点滴静注用285mg/V	1V		
3	DIV 点滴注射		15分	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
4	DIV 点滴注射		指示コメントに従う	時間未定
	希釈後、2mg/mLとなるよう調製。			
	ピロイ点滴静注用 100mg/V	800 mg /m ²		
	800mg/m ²			
	テルモ生食注 500mL	1本		
	注射用水 100mL(光製薬)	1本		
	1Vあたり水5mLで溶解			
5	DIV 点滴注射		Rp4)と同速度で	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
6	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
	オキサプラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V	130 mg /m ²		
	130mg/m ²			
7	DIV 点滴注射		15分で	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
	フラッシュ用			

病名 : CLDN18.2陽性の切除不能、進行再発の胃がん

レジメンセット名 : ゾルベツキシマブ+CapeOX(2回目以降)

1コース期間(休薬期間含む) 日 上限 コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射			時間未定
	カベツキシマブ2000mg/m ² /Day Day 1-14 ゾルベツキシマブ+CapeOX(2回目以降)			
	大塚生食注 50mL	1本		
	ルートキーフ用			
2	DIV 点滴注射		30分で	時間未定
	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL (アロキシ)	1本		
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカトロン)	1V		
	アロカリス点滴静注用235mg/V	1V		
3	DIV 点滴注射		15分	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
4	DIV 点滴注射		指示コメントに従う	時間未定
	希釈後、2mg/mLとなるように調製。			
	ピロイ点滴静注用 100mg/V	600 mg /m ²		
	600mg/m ²			
	テルモ生食注 500mL	1本		
	注射用水 100mL(光製薬)	1本		
	1Vあたり水5mLで溶解			
5	DIV 点滴注射		Rp4)と同速度で	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
6	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
	オキサリプラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V	130 mg /m ²		
	130mg/m ²			
7	DIV 点滴注射		15分で	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		
	フラッシュ用			