

病名 : 胃癌

レジメンセット名 : TS-1+CDDP療法(高用量)

1コース期間(休薬期間含む) 35 日 上限 6 コース

(シスプラチンのみ)

抗がん剤名	投与量 mg/m ²	設定%	設定理論量mg 理論量×設定%	Day
TS-1(1.25m未満)			80mg/body/day	day1-21
1日用量(分2)				
TS-1(1.25m以上~1.5m未満)			100mg/body/day	
1日用量(分2)				
TS-1(1.5m以上)			120mg/body/day	
1日用量(分2)				

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-3	時間未定	時間未定	時間未定
		80 mL/h ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3) TS-1+CDDP(高用量)	1本				
	2	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
		80 mL/h ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3) TS-1+CDDP(高用量)	1本				
	3	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
		80 mL/h ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3) TS-1+CDDP(高用量)	1本				
	4	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
		80 mL/h ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3) TS-1+CDDP(高用量)	1本				
	5	DIV 点滴注射		30時間で	時間未定		
		day1 CDDP投与前に ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本				
	6	DIV 点滴注射		day 1 30分で	時間未定		
		30 分で アロキシ静注 0.75mg/5mL/V デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトD) 大塚生食注 100mL	1V 1V 1本				
	7	DIV 点滴注射		day 1 2時間で	時間未定		
		2 時間で 全量を500mLに調製 テルモ生食注 500mL シスプラチン注「日医工」10mg/20mL/V 60mg/m ²	500 ml 60 mg /m ²				
	8	DIV 点滴注射		day 1 CDDP終了後30時間	時間未定		
		3 時間で					

	ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本				
9	DIV 点滴注射		day2	5時間で		時間未定
	5 時間で					
	ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本				
処方						