

病名 : 切除不能な進行・再発胃癌

レジメンセット名 : XELOX+HER療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

(XELOXのみ)

抗がん剤(商品名)及び用量・用法(1日投与量)				
抗がん剤名	投与量 mg/m ² or kg	設定%	設定理論量mg 理論量×設定%	Day
ゼローダ	2000	100%	0.0	day1-14
ハーセプチン 初回	8	100%	0.0	day1
ハーセプチン 2回目以降	6	100%	0.0	day1
オキサリプラチン	130	100%	0.0	day1

【初回】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 ゼローダ1000mg/m ² /回Day1-14 【初回】ハーセプチン+XELOX療法(2枠) 大塚生食注 50mL ラインキープ用	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 8mg/kg ハーセプチン注射用150 150mg/V(21mg/mL) 大塚生食注 250mL	8 mg /kg 1本	90分で	時間未定
	3	DIV 点滴注射 ハーセプチン終了後 クラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1V	全開で	時間未定
	4	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液「NKJ」100mg/20mL/V 130mg/m ²	1本 130 mg /m ²	2時間で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	全開で	時間未定
	処方				
	コメント				

【2回目以降】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 ゼローダ1000mg/m ² /回Day1-14 【2回目以降】ハーセプチン+XELOX療法(2枠) 大塚生食注 50mL ラインキープ用	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 6mg/kg ハーセプチン注射用150 150mg/V(21mg/mL)	6 mg /kg	30分で	時間未定

		オキサリプラチン点滴静注「NKJ」100mg/20mL/V	0 mg/m ²		
注射		大塚生食注 250mL	1本		
	3	DIV 点滴注射		全開で	時間未定
		ハーセプチン終了後			
		クラニセトロン点滴静注バッグ [®] 1mg/50mL(先:カイトル)	1本		
		デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V		
	4	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本		
		オキサリプラチン点滴静注「NKJ」100mg/20mL/V	130 mg/m ²		
		130mg/m ²			
	5	DIV 点滴注射		全開で	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本			
処方					
コメント					