

病名 : 切除不能な進行・再発胃癌

レジメンセット名 : **XP+HER療法**

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

(シスプラチンのみ)

抗がん剤(商品名)及び用量・用法(1日投与量)	投与量 mg/m <sup>2</sup> or kg	設定%	設定理論量mg 理論量×設定%	Day
ゼローダ	2000	100%	0.0	day1-14
ハーセプチン 初回	8	100%	0.0	day1
ハーセプチン 2回目以降	6	100%	0.0	day1
シスプラチン	80	100%	0.0	day1

**【初回】**

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-3	時間未定	時間未定	時間未定
		ゼローダ1000mg/m <sup>2</sup> Day 1-14 80 mL/h					
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3)	1本				
		初回ハーセプチン+XP療法					
	2	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
		80 mL/h					
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3)	1本				
	3	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
		80 mL/h					
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3)	1本				
	4	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
		80 mL/h					
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3)	1本				
	5	DIV 点滴注射		30時間で	時間未定		
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ウーイNF)	1本				
	6	DIV 点滴注射		day1 90分で	時間未定		
		8mg/kg					
		ハーセプチン注射用60 60mg/V(21mg/mL)	8 mg /kg				
		大塚生食注 250mL	1本				
	7	DIV 点滴注射		day1 30分で	時間未定		
		ハーセプチン終了後					
		アロキシ静注 0.75mg/5mL/V	1V				
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカT3)	1V				
		大塚生食注 100mL	1本				
8	DIV 点滴注射		day1 2時間で	時間未定			
	全量を500mLに調整 シスプラチン10時間前にイメット服用						
	テルモ生食注 500mL	500 ml					
	シスプラチン注「日医工」10mg/20mL/V	80 mg /m <sup>2</sup>					
	80mg/m <sup>2</sup>						

	9	DIV 点滴注射		day1	3時間で	時間未定		
		シスプラチン終了後						
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本					
	10	DIV 点滴注射		day2	5時間で	時間未定		
		5 時間で						
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本					
処方								
コメント								

## 【2回目以降】

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-3	時間未定	時間未定	時間未定
		セロータ1000mg/m <sup>2</sup> Day 1-14 80 mL/h					
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタタ3)	1本				
		ハーセフチン+XP【2回目以降】					
	2	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
		80 mL/h					
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタタ3)	1本				
	3	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
		80 mL/h					
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタタ3)	1本				
	ハーセフチン+XP【2回目以降】						
4	DIV 点滴注射		80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定		
	80 mL/h						
	ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタタ3)	1本					
5	DIV 点滴注射			3時間で	時間未定		
	ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本					
6	DIV 点滴注射			day1 30分で	時間未定		
	6mg/kg						
	ハーセフチン注射用60 60mg/V(21mg/mL)	6 mg /kg					
	大塚生食注 250mL	1本					
7	DIV 点滴注射			day1 30分で	時間未定		
	ハーセフチン終了後						
	アロキシ静注 0.75mg/5mL/V	1V					
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:チカドロン)	1V					
	大塚生食注 100mL	1本					
8	DIV 点滴注射			day1 2時間で	時間未定		
	全量を500mLに調製 シスプラチン1時間前コイット服用						
	テルモ生食注 500mL	500 ml					
	シスプラチン注「日医工」10mg/20mL/V	80 mg /m <sup>2</sup>					
	80mg/m <sup>2</sup>						
9	DIV 点滴注射			day1 3時間で	時間未定		
	シスプラチン終了後						
	ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本					
10	DIV 点滴注射			day2 5時間で	時間未定		
	5 時間で						

	ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本					
--	-------------------------	----	--	--	--	--	--