

病名 : 切除不能 再発胃癌

レジメンセット名 : XP療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

(シスプラチンのみ)

抗がん剤(商品名)及び用量・用法(1日投与量)				
抗がん剤名	投与量 mg/m <sup>2</sup>	設定%	設定理論量mg 理論量×設定%	Day
ゼローダ	2000	100%	0.0	day1-14
シスプラチン	80	100%	0.0	day1

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	DIV 点滴注射 ゼローダ1000mg/m <sup>2</sup> Day1-14 80 mL/h ソルデム3A輸液 500mL(先:ソタ3) XP	1本	80mL/hr day 1-3	時間未定	時間未定	時間未定
	2	DIV 点滴注射 80 mL/h ソルデム3A輸液 500mL(先:ソタ3)	1本	80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
	3	DIV 点滴注射 80 mL/h ソルデム3A輸液 500mL(先:ソタ3)	1本	80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 80 mL/h ソルデム3A輸液 500mL(先:ソタ3)	1本	80mL/hr day 1-2	時間未定	時間未定	
	5	DIV 点滴注射 Day1シスプラチン投与前 ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本	3時間で	時間未定		
	6	DIV 点滴注射 アロキシ静注 0.75mg/5mL/V デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン) 大塚生食注 100mL	1V 1V 1本	day1 30分で	時間未定		
	7	DIV 点滴注射 全量を500mLに調製 シスプラチン1時間前にイモト服用 テルモ生食注 500mL シスプラチン注「日医工」10mg/20mL/V 80mg/m <sup>2</sup>	500 ml 80 mg /m <sup>2</sup>	day1 2時間で	時間未定		
	8	DIV 点滴注射 シスプラチン終了後 ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本	day1 3時間で	時間未定		
	9	DIV 点滴注射 5 時間で ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本	day2 5時間で	時間未定		

処方  
以外

