病　名　　：**食道がん**

レジメンセット名　：　　**DCF療法**

1コース期間（休薬期間含む）　28　日　上限　2　コース

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射	1	DIV　点滴注射		3時間	時間未定				
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ヴィーンF)	1 本						
	2	DIV　点滴注射		3時間	時間未定				
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ヴィーンF)	1 本						
	3	DIV　点滴注射		30分で	時間未定				
		側管より ドセタキセル開始30分前から投与							
		アロキシ静注 0.75mg/5mL/V	1 V						
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デカドロン)	1 V						
		大塚生食注 100mL	1 本						
		イメンド内服							
	4	DIV　点滴注射		1時間で	時間未定				
		70mg/m²							
		ドセタキセル点滴静注液「EE」80mg/4mL(先:タキソテール)	70 mg /m²						
		大塚生食注 250mL	1 本						
	5	DIV　点滴注射		2時間	時間未定				
		70mg/m² 全量を500mLに調製							
		テルモ生食注 500mL	1 本						
		シスプラチン注「日医工」 10mg/20mL/V	70 mg /m²						
	6	DIV　点滴注射		24時間	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定
		700mg/m²　DCF療法 側管より Day1シスプラチン終了後							
		テルモ生食注 500mL	1 本						
		フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V	700 mg /m²						
	7	DIV　点滴注射		4時間	時間未定				
		シスプラチン終了後メインルートとして							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	8	DIV　点滴注射		4時間	時間未定				
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	9	DIV　点滴注射		4時間	時間未定				
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	10	DIV　点滴注射			時間未定				
		朝まで持続							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	11	DIV　点滴注射				時間未定	時間未定	時間未定	
		4 時間で							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	12	DIV　点滴注射				時間未定	時間未定	時間未定	
		4 時間で							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	13	DIV　点滴注射				時間未定	時間未定		
		4 時間で							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	14	DIV　点滴注射				時間未定			
		4 時間で							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
処方									
ｺﾒﾝﾄ									