

病名 : 食道がん

レジメンセット名 : FOLFOX+RT(食道)

1コース期間(休薬期間含む) 14 日 上限 なし コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 FOLFOX+RT(食道)(2枠) ラインキープ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	2	DIV 点滴注射 グラニセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デキトロン)	1本 1V	全開で	時間未定
	3	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注トローワ(先:インホリン)100mg/V 200mg/m <sup>2</sup>	1本 200 mg /m <sup>2</sup>	2時間で	時間未定
	4	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL オキサプラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V 85mg/m <sup>2</sup>	1本 85 mg /m <sup>2</sup>	2時間で	時間未定
	5	DIV 点滴注射 オキサプラチン終了後 大塚生食注 50mL フルオロウラシル注 250mg/5mL/V 400mg/m <sup>2</sup>	1本 400 mg /m <sup>2</sup>	全開で	時間未定
	6	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
	7	V 静脈内局所持続注入 インフューザーポンプで 大塚生食注 100mL 全量100mLで フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V 1600mg/m <sup>2</sup>	1本 1600 mg /m <sup>2</sup>	46時間	時間未定
	8	IVH 中心静脈注射 ポンプ終了時 ヘパフラッシュ 100単位/mLシリンジ 10mL	1筒		時間未定
	処方				
	コメント				