病　名　　：**食道癌**

レジメンセット名　：　　**FP療法(高用量)**

1コース期間(休薬期間含む)　21　日　上限　2　コース

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射	1	DIV 点滴注射			時間未定				
		FP療法(高用量) 4 時間で							
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ヴィーンF)	1 本						
	2	DIV 点滴注射		30分で	時間未定				
		アロキシ静注 0.75mg/5mL/V	1 V						
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デカドロン)	1 V						
		大塚生食注 100mL	1 本						
	3	DIV 点滴注射			時間未定				
		2 時間で 全量を500mLに調製							
		テルモ生食注 500mL	1 本						
		シスプラチン注「日医工」 10mg/20mL/V	80 mg /m²						
		80mg/m²							
	4	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定
		24時間で							
		テルモ生食注 500mL	1 本						
		フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V	800 mg /m²						
		800mg/m²							
	5	DIV 点滴注射			時間未定				
		4 時間で							
		ソルアセトF輸液 500mL(先:ヴィーンF)	1 本						
	6	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
		4 時間で							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	7	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
		4 時間で							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	8	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	時間未定		
		4 時間で							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
	9	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定			
		4 時間で							
		ソルデム3A輸液 500mL(先:ソリタT3)	1 本						
処方									
ｺﾒﾝﾄ									