

病名 : 切除治癒不能な肺癌

レジメンセット名 : ABI+GEM

1コース期間(休薬期間含む) 28 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射		30分で	時間未定
		ABI+GEM療法(Day 1,8,15) ①コース:28日			
		アロキシ静注 0.75mg/5mL/V	1V		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先行カトロン)	2V		
		大塚生食注 100mL	1本		
	2	DIV 点滴注射		30分で	時間未定
		フィルター禁 泡立つため、振とう注意			
		アブラキサン点滴静注用100mg/V	125 mg /m <sup>2</sup>		
		125mg/m <sup>2</sup> 、5mg/mLに調製			
		大塚生食注 100mL	1本		
	3	DIV 点滴注射		15分で	時間未定
		ルートフラッシュ用			
		大塚生食注 50mL	1本		
	4	DIV 点滴注射		30分で	時間未定
		ケムシレン点滴静注用「ヤクル」1g/V(先 ジエムサール)	1000 mg /m <sup>2</sup>		
	1000mg/m <sup>2</sup>				
	大塚生食注 100mL	1本			
5	DIV 点滴注射		15分で	時間未定	
	ルートフラッシュ用				
	大塚生食注 50mL	1本			
処方					
コメント					