

病名 : 治癒切除不能な進行・再発肺癌

レジメンセット名 : FOLFIRINOX療法

1コース期間(休薬期間含む) 14 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 START 大塚生食注 100mL FOLFIRINOX(肺癌)	1本		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 グラニセロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL(先: カイトル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テクトロン)	1本 1V	全開で	時間未定	
	3	DIV 点滴注射 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL オキサリプラチン点滴静注液「NK」100mg/20mL/V 85mg/m ²	1本 85 mg /m ²	2時間で	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 イリナカンと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL レボホリナート注トローフ(先:アイソリン)100mg/V 200mg/m ²	1本 200 mg /m ²	2時間で	時間未定	
	5	DIV 点滴注射 レボホリナートと同時に ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL イリナカン塩酸塩注トローフ 40mg/2mL/V(先: カンフト) 180mg/m ²	1本 180 mg /m ²	90分で	時間未定	
	6	DIV 点滴注射 レボホリナート終了後 大塚生食注 50mL フルオロウラシル注 250mg/5mL/V 400mg/m ²	1本 400 mg /m ²	全開で	時間未定	
	7	V 静脈内局所持続注入 インフューザーポンプ [®] で 大塚生食注 100mL 全量100mLで フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V 2400mg/m ²	1本 2400 mg /m ²	46時間	時間未定	
	8	IVH 中心静脈注射 ポンプ終了時 ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒		時間未定	
	処方					