

病名 : 進行胆道癌

レジメンセット名 : GEM+TS-1

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 PDまで コース

抗がん剤(商品名)及び用量・用法(1日投与量)				
抗がん剤名	投与量 mg/m <sup>2</sup>	設定%	設定理論量mg 理論量×設定%)	Day
TS-1(1.25㎡未満) 1日用量(分2)			60mg/body/day	day1-14  <b>15-21 休薬</b>
TS-1(1.25㎡以上~1.5㎡未満) 1日用量(分2)			80mg/body/day	
TS-1(1.5㎡以上) 1日用量(分2)			100mg/body/day	
ゲムシタピン	1000	100%	0.0	day1.8

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 GS療法(S1; day1-14) インターバル: 21日		30分で	時間未定
		グラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL(先: カイトリル)	1本		
		デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デキサロン)	1V		
	2	DIV 点滴注射 Day1, 8		30分で	時間未定
		大塚生食注 100mL	100 ml		
		GEMZAR(1000mg/m <sup>2</sup> )			
		ゲムシタピン点滴静注用「ヤクト」1g/V(先: ジェムサール)	1000 mg /m <sup>2</sup>		
	3	DIV 点滴注射		15分で	時間未定
		大塚生食注 50mL	1本		
処方					
コメント					