

病名 : 進行・再発の胆道がん

レジメンセット名 : ペムプロリズマブ+GC (Day1)

1コース期間(休業期間含む)  日 上限  コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 Day1、メインルート ペムプロリズマブ+GC(Day1)(胆道) 大塚生食注 50mL ルートキープ用	1 本	5~10分で	時間未定
2	DIV 点滴注射 Day1、メインルート キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V インラインフィルター使用 大塚生食注 100mL 200mg/Body	200 mg /Body 1 本	30分で	時間未定
3	DIV 点滴注射 メインルート テルモ生食注 500mL	1 本	1時間で	時間未定
4	DIV 点滴注射 メインルート テルモ生食注 1000mL	1 本	2時間で	時間未定
5	DIV 点滴注射 Rp04と同時に、側管 側管より パロセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL (アロキソ) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先デキソロン)	1 本 1 V	30分で	時間未定
6	DIV 点滴注射 側管 側管より シスプラチン注「マルコ」 10mg/20mL/V 25mg/m2 大塚生食注 250mL	25 mg /m <sup>2</sup> 1 本	1時間で	時間未定
7	DIV 点滴注射 側管 側管より ケムシロシ点注静注用「ヤクルト」1g/V(先 ジェムサル) 1000mg/m2 大塚生食注 100mL	1000 mg /m <sup>2</sup> 1 本	30分で	時間未定
8	DIV 点滴注射 側管 大塚生食注 50mL 側管ルートフラッシュ用	1 本		時間未定

病名 : 進行・再発の胆道がん

レジメンセット名 : ペムプロリズマブ+GC (Day8)

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 メインルート		1時間で	時間未定
	テルモ生食注 500mL ペムプロリズマブ+GC(Day8)(胆道)	1本		
2	DIV 点滴注射 メインルート		2時間で	時間未定
	テルモ生食注 1000mL	1本		
3	DIV 点滴注射 Rp02と同時に、側管より 側管より		30分で	時間未定
	パロキサロン点滴静注パック0.75mg/50mL (アロキン)	1本		
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:パロキサロン)	1V		
4	DIV 点滴注射 側管 側管より		1時間で	時間未定
	シスプラチン注「マルコ」10mg/20mL/V 25mg/m <sup>2</sup>	25 mg /m <sup>2</sup>		
	大塚生食注 250mL	1本		
5	DIV 点滴注射 側管 側管より		30分で	時間未定
	ケムシロンの点滴静注用「ヤクルト」1g/V(先 ジェムサール)	1000 mg /m <sup>2</sup>		
	1000mg/m <sup>2</sup>			
	大塚生食注 100mL	1本		
6	DIV 点滴注射 側管 側管ルートフラッシュ用			時間未定
	大塚生食注 50mL	1本		

病名 : 進行・再発の胆道がん

レジメンセット名 : ペムブロリズマブ+GEM (Day1)

1コース期間(休薬期間含む)  日 上限  コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 ペムブロリズマブ+GEM(Day1) ルートキーブ用 大塚生食注 50mL	1 本	15分で	時間未定
2	DIV 点滴注射 インラインフィルターを使用 大塚生食注 100mL キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V 200mg/Body	1 本 200 mg /Body	30分で	時間未定
3	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1 本	15分で	時間未定
4	DIV 点滴注射 クラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトルーダ) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1 本 1 V	30分で	時間未定
5	DIV 点滴注射 大塚生食注 100mL ケムシレン点滴静注用「ヤクルト」1g/V(先: ジェムサール) 1000mg/m <sup>2</sup>	100 ml 1000 mg /m <sup>2</sup>	30分で	時間未定
6	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1 本	15分で	時間未定

病名 : 進行・再発の胆道がん

レジメンセット名 : ペムブロリズマブ+GEM (Day8)

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 ペムブロリズマブ+GEM(Day8) クラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトルーダ) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1 本 1 V	30分で	時間未定
2	DIV 点滴注射 大塚生食注 100mL ケムシレン点滴静注用「ヤクルト」1g/V(先: ジェムサール) 1000mg/m <sup>2</sup>	100 ml 1000 mg /m <sup>2</sup>	30分で	時間未定
3	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1 本	15分で	時間未定