

病名 : 子宮頸がん

レジメンセット名 : TP(T:175 P:50)療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
1	DIV 点滴注射 (アフレキサト含有)TP ①コース:21日 ソルアセトD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本	2時間で	時間未定		
2	DIV 点滴注射 側管より クラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL(先: カイトリル) デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1.5V	15分	時間未定		
3	DIV 点滴注射 側管より ファモチジン注射液 20mg/A(前:カモファー) ポララミン注 5mg/1mL/A 大塚生食注 50mL	1A 1A 1本	15分	時間未定		
4	DIV 点滴注射 175mg/m ² パワリタキセル注「ホスピール」 30mg/5mL/V(タキソール) ブドウ糖液(テルモ糖注) 5% 500mL	175 mg /m ² 1本	3時間で	時間未定		
5	DIV 点滴注射 50mg/m ² 全量で500mLに調製 シスプラチン注「日医工」 10mg/20mL/V テルモ生食注 500mL	50 mg /m ² 1本	2時間で	時間未定		
6	IV 静脈内注射 ラシックス注 20mg/2mL/A	1A	シスプラチン開始 後iv.	時間未定		
7	DIV 点滴注射 ポタコールR輸液 500mL	1本		時間未定		
8	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ソタT3)	1本		時間未定		
9	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ソタT3)	1本		時間未定		
10	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ソタT3)	1本		時間未定		

11	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定
	TP療法 Day2-3				
	ソルアセトD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本			
12	DIV 点滴注射		30分で	時間未定	時間未定
	側管より				
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V			
	プリンペラン注射液 10mg/2mL/A	1A			
	大塚生食注 100mL	1本			
13	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定
	アクチット輸液 500mL(バック)	1本			
14	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定
	ソルアセトD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本			
15	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定
	アクチット輸液 500mL(バック)	1本			
16	IV 静脈内注射			時間未定	
	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒			
					
1				●	
	アプレピタントカプセル125mg(先:イメンド)	1カプセル			
	抗がん剤投与前に内服				
					
1				●	→
	アプレピタントカプセル80mg(先:イメンド)	1カプセル			
	1日1回 朝食後				